Parco Villa Baragiola

Angiosperme

1 Fagus sylvatica L. "Atropurpurea tricolor"
2 Platanus x acerifolia (Ait.) Willd.
3 Aesculus hippocastanum L.
4 Liquidambar styraciflua L.
5 Tilia platyphyllos Scop.
6 Buxus sempervirens L.
7 Carpinus betulus L.
8 Ulmus laevis Pall.
9 Fraxinus excelsior L.
10 Acer pseudoplatanus L.
11 Betula pendula Roth
12 Acer platanoides L.
13 Acer saccharinum L.
14 Fagus sylvatica L.
15 Ilex aquifolium L.
16 Celtis australis L.
17 Fagus sylvatica L. f. pendula
18 Liriodendron tulipifera L.
19 Magnolia spp. (a foglia caduca)
20 Quercus robur L.
21 Tilia cordata Miller
22 Fraxinus americana L.
23 Magnolia grandiflora L.
24 Populus nigra L. "Italica"
25 Tilia tomentosa Moench.
26 Prunus avium L.
27 Ligustrum ovalifolium L.
28 Laurus nobilis L.
29 Carpinus betulus L. "Fastigiata"
30 Fagus sylvatica L. "Asplenifolia"
31 Fagus sylvatica L. f. purpurea
32 Castanea sativa Miller
33 Quercus ilex L.
34 Prunus laurocerasus L.
35 Alnus cordata Desf.
36 Aesculus parviflora Walt.
37 Robinia pseudoacacia L.
38 Aucuba japonica Thunb.
39 Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton
40 Deutzia scabra Thunb.
41 Ulmus minor Mill.
42 Corylus avellana L.
43 Trachycarpus fortunei Wendl.
44 Acer campestre L.
45 Laburnum anagyroides Med.
46 Nerium oleander L.
47 Prunus spinosa L.
48 Osmanthus x fortunei Carr.
49 Parrotia persica (DC.) C. A. Mey
50 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
51 Syringa vulgaris L.
52 Yucca gloriosa L.
53 Tilia americana L.
54 Catalpa bignonioides Walt.
55 Quercus petraea (Matt.) Lieb.
56 Lagerstroemia indica L.
57 Acer palmatum Thunb.
58 Spiraea spp.
59 Forsythia spp.
60 Viburnum tinus L.
61 Prunus cerasifera Ehr. var. atropurpurea
62 Poncirus trifoliata Rafin.
63 Eleagnus pungens Thunb.
64 Cornus controversa Hensl.
65 Cornus florida L.
66 Rhododendron arboreum Smith
67 Rhododendron spp.
68 Camellia japonica L.
69 Ligustrum sinense Lour.
70 Mahonia aquifolium Nutt.
71 Quercus suber L.
72 Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman
73 Wisteria sinensis Sweet
74 Staphylea colchica Stev.
75 Prunus armeniaca L.
76 Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC.
77 Nandina domestica Thunb.
78 Prunus lusitanica L.
79 Diospyros lotus L.
80 Cornus kousa Buerg. ex Hance
81 Idesia polycarpa Maxim.
82 Callistemon speciosus (Sims) DC.
83 Osmanthus fragrans Lour.
84 Tamarix gallica L.
85 Pyracantha coccinea Roem.
86 Skimmia japonica Thunb.
87 Arbutus unedo L.
88 Philadelphus coronarius L.
89 Davidia involucrata Baill.
90 Callicarpa bodinieri Lev.
91 Edgeworthia papyrifera Sieb. e Zucc.
92 Morus nigra L.
93 Ligustrum lucidum Ait. f.
94 Corylopsis spicata Sieb. e Zucc.
95 Cotoneaster franchetii Boiss.
96 Photinia davidiana (Decne.) Cordot
97 Berberis thunbergii DC.
98 Aesculus x carnea Hayne
99 Koelreuteria paniculata Laxm.

Gimnosperme

A Taxus baccata L.
B Cedrus deodara (Roxb.) G. Don
C Abies nordmanniana (Stev.) Spach.
D Gingko biloba L.
E Thuja occidentalis L.
F Calocedrus decurrens (Torr.) Florin
G Pinus sylvestris L.
H Larix decidua Mill.
I Picea abies (L.) Karsten
J Pseudotsuga menziesii (Mirbel.) Franco
K Juniperus x media van Melle "Pfitzeriana Glauca"
L Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.
M Thuja plicata Donn ex D. Don
N Pinus nigra Arnold
N lar Pinus nigra Arnold subsp.
O Abies alba Mill.
P Abies koreana Wils.
Q Chamaecyparis pisifera (Sieb. e Zucc.) Endl.
R Cupressus sempervirens L.
S Picea pungens Engelm. f. glauca
T Cedrus libani A. Richard
U Picea orientalis (L.) Link
V Cedrus atlantica Manetti
W Pinus pinea L.
X Pinus strobus L.
Y Cephalotaxus fortunei Hook
Z Araucaria araucana (Mol.) K. Koch
AA Tsuga canadensis (L.) Carr.
AB Cupressus cashmeriana Royle ex Carr.
AC Sciadopitys verticillata (Thunb.) Sieb. e Zucc.
AD Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.
AE Chamaecyparis obtusa (Sieb. e Zucc.) Endl.
AF Abies concolor (Gord.) Hildebrand
AG Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz
AH Pinus wallichiana A. B. Jacks
AI Cupressus arizonica Greene
AJ Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don
AK Thuja orientalis L.
AL Picea omorika (Pancic) Purkine
AM Larix kaempferi (Lamb.) Carr.



100 Hibiscus syriacus L.
101 Kolkwitzia amabilis Graebn.
102 Viburnum x bodnantense Aberconway
103 Quercus rubra L.
104 Juglans regia L.
105 Calycanthus praecox L.
106 Diospyros kaki L.
107 Populus x canadensis Moench
108 Kalmia latifolia L.
109 Cornus nuttallii Audub.
110 Deutzia gracilis Sieb. e Zucc.
111 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green
112 Quercus palustris Muenchh.
113 Morus alba L.
114 Acer negundo L.
115 Cercis siliquastrum L.
116 Acacia dealbata Link.
117 Salix sp.
118 Tilia x europaea L.
119 Camellia sasanqua Thunb.
120 Platanus orientalis L.

LEGENDA

Esemplari arborei

Esemplari arbustivi

Siepi o architetture vegetali (es. carpineto)

lettera = latifoglie
numero = conifere

FRONT

I Giardini Estensi e il Parco di Villa Mirabello

"*…il giardino pubblico di Varese è uno dei più belli che esistano nell'Italia Settentrionale… L'altura ombreggiata di abeti e pini a parasole dà a questo giardino un carattere più grandioso; dalla terrazza la vista si estende su tutto il lago di Varese e sulle Alpi Occidentali*…" (G. Fauré, *Heures d'Italie*, 1921).

Nel 1760 il Duca Francesco d'Este acquistò una villa affacciata su un piccolo giardino ed i terreni circostanti nell'intento di realizzarvi un palazzo circondato da un vasto parco e stabilirvi la propria residenza.

I lavori vennero condotti a partire dal 1766 su progetto dell'Ing. Camerale di Milano Giuseppe Bianchi: la villa venne ristrutturata e ampliata e fu realizzato il giardino all'italiana con l'elegante *parterre* posto fra il palazzo e la collina. Al centro dell'altura venne poi collocato un ninfeo ancora oggi presente nelle sue forme fondamentali con tre nicchie rivestite da concrezioni in tufo e statue.

Nel 1837 la proprietà passò dagli Estensi al Dott. Robbioni il quale ridisegnò parzialmente il parco modificandolo secondo i canoni del "giardino all'inglese" mediante la creazione di nuovi percorsi e la messa a dimora di numerose specie di conifere. Adiacenti all'ala ovest del palazzo furono costruiti una filanda e un opificio per la lavorazione della seta, mentre al confine con la proprietà di Villa Mirabello venne realizzata la torre belvedere (1846).

Nel 1850 la proprietà passò a Cesare Veratti, nipote del Robbioni, il quale proseguì la trasformazione del parco, sino a quando, nel 1882, il complesso venne acquistato dal Comune di Varese.

Sebbene il parco aprì per la prima volta al pubblico il 25 Marzo 1883, solo alla fine del XIX secolo, dopo una serie di lunghi e accesi dibattiti, venne dato all'agronomo Luigi Cremona il compito di eseguire uno studio dettagliato circa le sorti del parco e le modalità di fruizione dello stesso.

.Egli suggerì, oltre alla realizzazione di alcune opere di sicurezza legate alla nuova funzione pubblica, di ricondurre il giardino entro gli schemi del primitivo impianto formale, ormai parzialmente cancellato dagli interventi ottocenteschi.

Accedendo ai giardini dall'androne principale del palazzo si osserva il vasto *parterre* all'italiana caratterizzato da aiuole e viali che disegnano la prospettiva verso il colle, alle cui pendici si trovano una fontana e scalinate che si arrampicano per i pendii, fiancheggiate a loro volta da rampe con berceaux di carpini.

A destra, dove si trova il laghetto dei cigni, il parco assume le forme del giardino all'inglese, con macchie di alberi a formare aiuole ombrose simili a boschi naturali, in cui si possono anche trovare maestosi esemplari arborei ornamentali come i faggi purpureo e a foglie di felce, alti pini neri di Corsica, querce, oltre a tassi, agrifogli, larici, pini silvestri e numerose altre specie.

Dalla sommità del colle, si accede direttamente all'area occupata da Villa Mirabello, sede dei Musei Civici, situata in posizione dominante rispetto al vasto parco paesistico.

La villa si affaccia a sud su un ampio spazio erboso caratterizzato da percorsi curvilinei che uniscono radure a macchie boschive di alberi ad alto fusto tra cui spiccano un superbo esemplare di cedro del Libano (*Cedrus libani*), tigli e un grande *Gingko biloba*.

Dalla villa Mirabello, scendendo verso il Liceo Musicale, si trovano ancora altri alberi maestosi, come un gruppo di ippocastani e di platani, e un esemplare di platano orientale, citato anche dal Corpo Forestale dello Stato nella lista degli alberi monumentali italiani, insieme al cedro del Libano su menzionato.

BACK

Latifoliae (Angiospermae)

114-Acacia dealbata Link. - **Mimosa** (Fam. *Leguminosae*) Pianta sempreverde originaria del Nuovo Galles del Sud (Australia) e della Tasmania, è diffusamente coltivata nell'Europa centrale e meridionale per le inflorescenze gialle e profumate, in vendita presso i fiorai all'inizio dell'anno. Le diffusissime della pianta è limitata a causa della sensibilità al gelo, ma nei paesi d'origine può raggiungere un'altezza di 24 m ed una circonferenza di circa 3 m. I tronchi sono ricoperti da un'ampia corteccia liscia di colore argento, con margini dentati; le foglie sono semplici e alternate, con due paia di pinnule, ciascuna con 15 paia di foglioline lunghe 2 cm. Presente nel parco di Villa Baragiola.

44-Acer campestre L. - **Acero campestre** (Fam. *Aceraceae*) Albero caducifoglio di piccole dimensioni, che raramente supera i 15 m di altezza, con chioma spesso compatta; è specie tipica delle siepi e boschi di pianura, i rami sono a volte muniti di creste sugherose; le foglie sono piccole, a 5 lobi con apici arrotondati, i fiori, riuniti in grappoli, compaiono insieme alle foglie; i frutti, dette samare, sono azzurrognoli. Le foglie sono composte da piccole foglioline lunghe 2 cm. Presente nel parco di Villa Baragiola.

3-Aesculus hippocastanum L. - **Ippocastano** (Fam. *Hippocastanaceae*) Albero deciduo originario del Balcani, importato a partire dal 1615, coltivato nel resto di tutta l'Europa come pianta ornamentale e per balaustre cittadine. Raggiunge i 20 m di altezza e 3000-200 anni di età. Ha caratteristici grossi rami ascendenti, grandi foglie opposte (sudddivise in 5-7 foglioline e stipolate e stipolate e foggiatigia), con margini dentati; ha fiori molto decorativi, bianchi o rosa a seconda degli varietà; i frutti, le cd. castagne d'India, sono rotondi e lucidi, con margini dentati; ha fiori molto decorativi, bianchi o rosa a seconda degli varietà; i frutti, le cd. castagne d'India, sono racchiuse in un riccio aculeato; in questi ultimi anni è attaccato da un insetto, la *Cameraria ohridella*, proveniente dall'Est europeo. Presente nel parco di Villa Baragiola.

36-Aesculus parviflora Walt. - **Ippocastano nano** (Fam. *Hippocastanaceae*) Pianta caducifoglia originaria degli stati sudorientali degli USA, ha l'aspetto di un cespuglio arbusto con fusto ramoso e rami a portamento arcuato; le foglie sono composte, produce vistosi fiori bianchi dai lunghi stami rosati; cresce bene in zone a estate umida. Presente nel parco di Villa Baragiola.

66-Camellia japonica L. - **Camelia** (Fam. *Theaceae*) Specie originaria di media grandezza (altezza sino a 15-20 m) con corteccia grigia e liscia simile a quella del faggio; foglie lanceolate dentate ai margini, fiori poco visibili dai cui si sviluppano piccole drupe nere. Si ha areale comprende una fascia lungo il Mediterraneo con limite settentrionale rappresentato dal versante sud delle Alpi; è presente anche in Giappone, dove si trova spontaneamente in vari ripari e nel versante sud comparsa di dense nocciolete di piccoli fiori rosa seguiti da frutti simili a ghiande. Presente nel parco Mentegazza.

82-Callistemon speciosus (Sims) DC. - **Callistemon** (Fam. *Myrtaceae*) Arbusto di origine australiana, che ben si adatta ai climi mediterranei e temperati; le sue caratteristiche principali è data dai fiori, simili a uno scovolo (il nome in inglese "bottlebrush" significa scarabeo dal fiori rossi che compaiono in primavera. Presente nel parco Mentegazza.

3-Aesculus hippocastanum L. - **Ippocastano** (Fam. *Hippocastanaceae*) Albero deciduo originario del Balcani, importato a partir dal 1615, coltivato nel resto di tutta l'Europa come pianta ornamentale e per balaustre cittadine. Raggiunge i 20 m di altezza e 3000-200 anni di età. Ha caratteristici grossi rami ascendenti, grandi foglie opposte (suddivise in 5-7 foglioline e stipolate e foggiatigia), con margini dentati; ha fiori molto decorativi, bianchi o rosa a seconda degli varietà; i frutti, le cd. castagne d'India, sono racchiuse in un riccio aculeato; in questi ultimi anni è attaccato da un insetto, la *Cameraria ohridella*, proveniente dall'Est europeo. Presente nel parco di Villa Baragiola.

36-Aesculus parviflora Walt. - **Ippocastano nano** (Fam. *Hippocastanaceae*) Pianta caducifoglia originaria degli stati sudorientali degli USA, ha l'aspetto di un cespuso arbusto con fusto ramoso e rami a portamento arcuato; le foglie sono composte, produce vistosi fiori bianchi dai lunghi stami rosati; cresce bene in zone a estate umida. Presente nel parco di Villa Baragiola.

66-Camellia japonica L. - **Camelia** (Fam. *Theaceae*) Specie originaria di media grandezza (altezza sino a 15-20 m) con corteccia grigia e liscia simile a quella del faggio; foglie lanceolate dentate ai margini, fiori poco visibili dai cui si sviluppano piccole drupe nere. Si ha areale comprende una fascia lungo il Mediterraneo con limite settentrionale rappresentato dal versante sud delle Alpi; è presente anche in Giappone, dove si trova spontaneamente in vari ripari e nel versante sud comparsa di dense nocciolete di piccoli fiori rosa seguiti da frutti simili a ghiande. Presente nel parco Mentegazza.

82-Callistemon speciosus (Sims) DC. - **Callistemon** (Fam. *Myrtaceae*) Arbusto di origine australiana, che ben si adatta ai climi mediterranei e temperati; le sue caratteristiche principali è data dai fiori, simili a uno scovolo (il nome in inglese "bottlebrush" significa scarabeo dal fiori rossi che compaiono in primavera. Presente nel parco Mentegazza.

115-Cercis siliquastrum L. - **Albero di Giuda** (Fam. *Leguminosae*) Albero a foglie decidue, originario delle regioni orientali del Mediterraneo e dell'Europa meridionale, viene piantato frequentemente come albero ornamentale in tutta l'Europa. Raramente lo si trova inselvatichito nelle nostre regioni. Può raggiungere un'altezza di 12 m ma generalmente si mantiene più basso e si presenta ramificato a poca distanza dal suolo. I fiori, rosso lilatino, sbocciano, molto numerosi, in aprile e maggio sui rami vecchi e perfino direttamente sul tronco (fenomeno detto cauliflorìa). I frutti sono baccelli a possono rimanere anche 10 cm di lunghezza; in estate, maturando, assumono tavolta una colorazione rosa vivo tendente al violaceo. Le foglie sono alternate-cuoriforme o reniformi, semplici, intere e glabre. Secondo alcuni viene leggendo la sua nome perché dal latto che Giuda si impiccò su rami, oppure che i fiori rappresenterebbero un tentativo di Gesù per ridare la vista al cieco nato. Presente nel parco di Villa Baragiola.

50-Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. - **Cotogno di Giappone** (Fam. *Rosaceae*) Arbusto caducifoglio originario del Giappone, alto 1,5-3 m; coltivato per la fioritura, che può iniziare in inverno, con fiori del rosa al rosso e bianco e seconda delle varietà; i rami sono spinosi e portano foglie alternate lungamente persistenti, e frutti gialli macchiettati di bruno, simili a mele, sono commestibili e spesso in passato si usava mangiarle e gelatine. Presente nel Giardini Estensi.

64-Cornus controversa Hemsl. - **Corniolo gigante** (Fam. *Cornaceae*) Piccolo albero alto sino a 13 m, originario di Cina, Corea e Giappone, che, a differenza di tutte le altre specie di *Cornus* aventi foglie opposte, ha foglie alterne, liscie con nervature evidenti, che diventano rosso porpora in autunno prima della caduta; sei fiori a stella appariscente, costituita da corolla, larghi circa 10 cm, di fiori bianchi, seguiti da bacche nere lucide. Presente nei Giardini Estensi - Mirabello, nel parchi Mentegazza e di Villa Augusta.

65-Cornus florida a 3 L. - **Corniolo da fiore** (Fam. *Cornaceae*) Questo arbusto deciduo, alto fino a 3-4 m, proviene dalle regioni orientali del nord America; ha foglie opposte; viene coltivato per le belle fioritura, costituita da coralli di piccoli fiori circondati da 4 brattee bianche o rosa, seguiti da bacche rosse in autunno, quando le foglie assumono colorazione rosso scarlata. Presente in tutti i parchi comunali di Varese.

80-Cornus kousa Buerg. ex Hance (Fam. *Cornaceae*) Arbusto o piccolo albero caducifoglio alto sino a 6-7 m, proveniente da Giappone, Corea e Cina centrale e occidentale; ha foglie opposte; con epiche apparitio e neervature evidenti; fiorisce in giugno - luglio con coralli di piccoli fiori circondati da 4 brattee bianco pure; appunita. Presente nel parco Mentegazza.

109-Cornus nuttallii Audub. - **Corniolo del Pacifico** (Fam. *Cornaceae*) Arbusto o albero deciduo alto fino a 12-18 m, originario delle regioni nordoccidentali degli Stati Uniti; anch'esso risulta molto decorativo durante la fioritura: i piccoli fiori di color porpora scuro sono circondati da 4-7 grosse brattee bianco-cremate, varianti al rosa che l'età; i fiori sono seguiti da bacche rosse riunite in grappoli; anche le foglie si tingono di rosso, anche o giallo in autunno. Presente nel parco di Villa Baragiola.

94-Corylopsis spicata Sieb. & Zucc. - **Coriolopsis** (Fam. *Hamamelidaceae*) Questo arbusto caducifoglio, alto sino a 2 m, proviene dal Giappone; ha foglie ovate-ellittiche, con margine dentato; fiorisce in aprile, prima delle foglie, con piccoli fiori gialli a grappolo e con antere scure e ricoperte da una pellicola bianca. Presente nel parco Mentegazza.

42-Corylus avellana L. - **Nocciolo** (Fam. *Corylaceae*) "Nome comune deriva dal greco Keys = casco, dalla cupola che ricopre il frutto; e da Abella = Avellino, dove il nocciolo è stato coltivato in tempi antichi. Arbusto deciduo alto fino a 4-7 m con elevata capacità polloniferà, ramificato sin dalla base, raggiunge i 60-70 anni di età. Le foglie hanno margini grossolanamente dentati; i fiori compaiono in pieno inverno: quelli maschili sono portati in lunghi amenti gialli; mentre quelli femminili, sono costituiti da una gemma globosa da cui fuoriescono corti stimmi rossi. Allo stato spontaneo è piante consumissima in tutti i boschi cedui; spesso costituisce una piantaria di siepi e di Alberi. Presente nei Giardini Estensi - Mirabello.

32-Cotinus coggygria Scop. - **Cotinus** (Fam. *Anacardiaceae*) Albero deciduo originario del Europa centrale e dell'Asia Minore, con ampie chioma tondeggiante, che assume tonalità vivaci in autunno, quando le foglie assumono colorazione rosso scarlata. Presente in tutti i parchi comunali di Varese.

7-Carpinus betulus L. - **Carpino bianco** (Fam. *Corylaceae*) Albero caducifoglio alto 10-12 m, può raggiungere i 20-25 in condizioni favorevoli, ma in realtà la crescita è molto lenta; ha fusto a sezione irregolare dal grande sviluppo, con margine dappiramenti seghettati; ha rami, in inverno, rivestiti da una sottile corteccia liscia grigia, e gemme ovoidali, con margine seghettato; ha foglie semplici, ovate-oblunghe, con margine dappiramenti seghettati; ha fiori, riuniti in infiorescenze, sono piccoli amenti portati da ogni pianta; i fiori maschili e femminili, che compaiono insieme alle foglie, sono portati su amenti separati; i frutti, riuniti in infiorescenze, sono piccoli achenii portati da ogni pianta; ha ciò caratteristica di questa pianta: sopitoto bene la potatura e per essere sagomato a piramide, a colonna, a pergolato (cresce nel Giardini Estensi); è candeliere. Distribuito in tutta l'Europa centrale, in Italia è presente in tutto l'arco alpino, in Liguria, Emilia e Toscana e meno frequentemente nell'Appennino centrale. Insieme alla farnia costituisce la specie tipica del bosco planiziale della pianura padana. Presente in tutti i parchi comunali di Varese.

29-Carpinus betulus L. - **"Pastigiata" - Carpino bianco piramidale** (Fam. *Corylaceae*) La varietà è pastigiata del carpino bianco differisce dal tipo per avere rami più appressati e fusto, assumendo così un portamento più piramidale. Presente nei Giardini Estensi - Mirabello.

97-Berberis thunbergii DC. - **Crespino di Thunberg** (Fam. *Berberidaceae*) Arbusto fra i più coltivati del genere *Berberis*, ha origini giapponesi; cresce fino a un massimo di 1,5 m di altezza e ha piccole foglie, decidue, quasi lanceolgianti; i fiori sono anche piccole bacche rosse. Presente in tutti i parchi comunali di Varese.

38-Aucuba japonica Thunb. - **Aucuba** (Fam. *Cornaceae*) Arbusto sempreverde originario del Giappone, che può raggiungere i 2-3 m di altezza; ha foglie ovale lunghe sino a 25 cm e grossolanamente dentate; di colore verde scuro, spesso macchiate di giallo; è tratta in una pianta dicica (individui maschili e femminili separati) pertanto solo sulle piante femminili compariranno in autunno le piccole bacche rosse. Presente in tutti i parchi comunali di Varese.

57-Acer campestre Thunb. - **Acero giapponese** (Fam. *Aceraceae*) Acero originario del Giappone, molto diffuso come pianta ornamentale; gradisce soprattutto le foglie a 3 e 3,7 m di altezza, con margine seghettato, fiori ad ombrelle, costituiti da cinque petali, sono riunite in corimbi, dagli innesce esso ha samare piccole e ricoperte da cinque peli; quelli femminili sono riuniti in grappoli penduli verdi. Le samare presentano ali lunghe da 3 a 3,7 cm; le foglie non compaiono da cinque foglioline, ma possono essere anche solitarie tre. La pianta può diventare insetanie. Presente nei Giardini Estensi - Mirabello e nei parco di Villa Baragiola.

87-Ilex aquifolium L. - **Agrifoglio** (Fam. *Aquifoliaceae*) Albero sempreverde di media grandezza, con fusto cilindrico, con margine dappiramenti seghettato; ha rami, in inverno, rivestiti da una sottile corteccia liscia grigia, e gemme ovoidali, con margine seghettato; ha foglie semplici, ovate-oblunghe, con margine dappiramenti seghettati; ha fiori, riuniti in grappoli penduli, bianco-rosati, compaiono in autunno, consentendo con i rossi e tondi frutti di color verde brillante; i fiori, riuniti in grappoli penduli, bianco-rosati, compaiono in autunno, consentendo con i rossi e tondi frutti di color verde brillante. Presente nei parchi Mentegazza e di Villa Augusta.

7-Carpinus betulus L. - **Carpino bianco** (Fam. *Corylaceae*) Albero caducifoglio alto 10-12 m, può raggiungere i 20-25 in condizioni favorevoli, ma in realtà la crescita è molto lenta; ha fusto a sezione irregolare dal grande sviluppo, con margine dappiramenti seghettato; ha rami, in inverno, rivestiti da una sottile corteccia liscia grigia, e gemme ovoidali, con margine seghettato; ha foglie semplici, ovate-oblunghe, con margine dappiramenti seghettati; ha fiori, riuniti in infiorescenze, sono piccoli achenii portati da ogni pianta; i fiori maschili e femminili, che compaiono insieme alle foglie, sono portati su amenti separati; i frutti, riuniti in infiorescenze, sono piccoli achenii portati da ogni pianta; è specie tipica delle siepi e boschi di pianura, i rami sono a volte muniti di creste sughere; ha foglie semplici, ovate-oblunghe, con margine dappiramenti seghettati; ha fiori, riuniti in infiorescenze, sono piccoli amenti